

HOSTIL 1.8 EC[®]

Concentrado Emulsionable (EC) - Registro Nacional ICA 2418



COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo: Abamectina 18 g/L.

Mezcla de avermectinas con mas de 80% de avermectina B1A y menos del 20% de avermectina B1B, de Formulación a 20° C

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

INFORMACION GENERAL

HOSTIL 1.8 EC, insecticida - acaricida producido por el microorganismo (*Streptomyces avermitilis*), de acción translaminar, eficaz en el control de los estados móviles de los ácaros.

PRESENTACIONES

HOSTIL 1.8 EC se encuentra en presentaciones de 1L.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- * No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- * No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- * Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- * Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- * Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, máscara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- * Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- * Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.
- * Causa irritación moderada a los ojos

MANEJO DE ENVASES

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empresa original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS Lt / Ha	*P.C.	*P.R.
Rosas (<i>Rosa spp.</i>)	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,47 L/ha	N.A	4 Horas
Citricos (<i>Citrus Sinesis</i>)	Acaro Blanco (<i>Poliphagotarsonemus latus</i>)	0,8 L/ha	14 días	
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Gusano Cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	1,0 L/ha	14 días	



Calle 108#51-81 Barrio Pasadena, Bogotá, Colombia
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831
 colombia@agrocentro.info
 www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

