

## FICHA TÉCNICA



- NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:** SINCOGIN SL
- TIPO DE FORMULACION:** Solución Líquida
- DESCRIPCION:** Extractos vegetales dentro de los cuales se destacan citoquininas, glucósidos, porfirinas, morfógenos y minerales.
- FORMULADOR:** Agriculture Sciences, INC., Texas Estados Unidos
- TITULAR DEL REGISTRO:** MAGRO S.A.
- REGISTRO DE VENTA ICA N°:** 2913
- COMPOSICION:**  
Compuestos Orgánicos de Extractos de Plantas : 56%  
Ácidos Grasos : 4%  
Extractos Minerales : 39%
- MODO DE ACCION:** SINCOGIN SL es catalogado por la EPA como una agente nematocida y fungicida de múltiples modos de acción bioquímica.

### VENTAJAS

Herramienta de carácter orgánico en el manejo de poblaciones de nematodos.

Avalado por la EPA

Recupera la actividad en la zona de raíces

No genera residuos o trazas químicas en los productos en fresco

No genera resistencia

Baja categoría Toxicológica

Facilidad de aplicación

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.

[WWW.MAGRO.COM.CO](http://WWW.MAGRO.COM.CO)

Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano

Modulo 2, Bodega 36

PBX 8415050

## FICHA TÉCNICA

### RECOMENDACIONES

Antes de la aplicación se debe llevar el suelo a capacidad de campo par garantizar una mejor distribución del producto en el suelo

Se puede aplicar en drench

Después de aplicado deje como mínimo 2 días sin aplicar riego

Puede ser aplicado en el sistema de riego por goteo

### 9. USO AGRICOLA:

CULTIVO	EPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS
Banano, Café, Citricos	Después de la siembra, aplicaciones adicionales cada 3 o 4 meses	1,5 – 2 lt/Ha
Tomate, Arroz, Algodón, Soya, Melon, papa	5 – 10 Después de la germinación o del trasplante, aplicaciones adicionales cada 3 o 4 meses	1,5 – 2 lt/Ha
Flores Rosa, Clavel y Pompom	Cuando se presentan nematodos, 3 aplicaciones con intervalos de 8 días Aplicaciones adicionales en drench cada 30 o 45 días	0,7 - 1 cc / M2 o 0,3 – 0,5 cc Lt de Agua
Hortalizas	Cuando se presentan nematodos, 3 aplicaciones con intervalos de 8 días Aplicaciones adicionales en drench cada 30 o 45 días	1,5 – 2 lt/Ha

Se debe aplicar 6 – 7 días después de siembra (Plantulas) o emergencia (semillas).

Antes de la aplicación se debe llevar el suelo a capacidad de campo para garantizar una mejor distribución del producto en el suelo

Después de aplicado deje como mínimo 2 días sin aplicar riego

Puede ser aplicado en el sistema de riego por goteo

Para mezclas de agroquímicos se recomienda realizar **SIEMPRE** pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario, antes de realizar la aplicación.

Aplique SINCOCIN SL en drench (inyectado al suelo), solo o acompañado con un coadyuvante. Aplique Sincocin SL con el suelo húmedo. En algunos casos es beneficioso mezclarlo con fuentes de nitrógeno amoniacal.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.

[WWW.MAGRO.COM.CO](http://WWW.MAGRO.COM.CO)

Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano

Modulo 2, Bodega 36

PBX 8415050



Fecha de Emisión inicial: Diciembre 2000

Fecha de Actualización: Abril 2019

Actualización 15

Página 3 de 3

## FICHA TÉCNICA

- 10. COMPATIBILIDAD:** SINCOGIN SL es fitocompatible con los productos de uso agrícola. Cuando se desconozca la compatibilidad con algún plaguicida, es recomendable realizar pruebas previas. Así también, se recomienda hacer una prueba en un área pequeña antes de una aplicación total
- 11. PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:** 250 cc, 1 litro, 4 litros, 10 litros y 200 litros
- 12. AVISO AL AGRICULTOR**
- **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**
    - Manténgase fuera del alcance de los niños.
    - Mantenga el recipiente bien cerrado.
    - Mantenga lejos de alimentos, bebidas.
    - No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
    - Evítese el contacto con los ojos y la piel.
    - No tirar los residuos por el desagüe.
    - Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
    - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
    - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).
  - **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**
    - Guardar en sitio fresco y al abrigo de la luz solar directa.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.**

**Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano**

**Modulo 2, Bodega 36**

**PBX 8415050**

Si requiere información sobre manejo seguro de agroquímicos consultar la siguiente dirección:

<https://www.magro.com.co/quienes-somos>

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.

[WWW.MAGRO.COM.CO](http://WWW.MAGRO.COM.CO)

Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano

Modulo 2, Bodega 36

PBX 8415050