

FICHA TECNICA

PRODUCTO: FUNGIMIX 325 SC
CLASIFICACION: FUNGICIDA AGRICOLA

VERSIÓN: 03.2S.
FECHA ACTUALIZADA: 07/23.
REGISTRO NACIONAL: PL0012182023



FUNGIMIX 325 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

REGISTRO NACIONAL ICA:

PL0012182023

TITULAR DEL REGISTRO:

SHARDA COLOMBIA S.A.S

COMPOSICIÓN GARANTIZADA.

NOMBRE DE LOS INGREDIENTES ACTIVOS:

AZOXYSTROBIN: 200 gr/L

FLUTRIAFOL: 125 gr/L

Ingredientes Aditivos e Inertes: c.s.p. 1 litro

Formulación a 20 °C

NOMBRE QUIMICO DE LOS ACTIVOS:

AZOXYSTROBIN

FLUTRIAFOL

NOMBRE IUPAC:

AZOXYSTROBIN

Methyl(2E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate

FLUTRIAFOL

(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl

FORMULA EMPIRICA:

AZOXYSTROBIN


C₂₂H₁₇N₃O₅

FLUTRIAFOL


C₁₆H₁₃F₂N₃O

FORMULA ESTRUCTURAL:

AZOXYSTROBIN



FLUTRIAFOL



GRUPO QUIMICO:

AZOXYSTROBIN

ESTROBIRULINA

FLUTRIAFOL

TRIAZOL, CONAZOLE

FICHA TECNICA

PRODUCTO: FUNGIMIX 325 SC
CLASIFICACION: FUNGICIDA AGRICOLA

VERSIÓN: 03.2S.
FECHA ACTUALIZADA: 07/23.
REGISTRO NACIONAL: PL0012182023

FORMULACION:	SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC
PESO MOLECULAR g/mol-1*:	
AZOXYSTROBIN	403.4 g/mol-1
FLUTRIAFOL	301.29
SOLUBILIDAD EN AGUA mg/L a 20 °C *:	
AZOXYSTROBIN	6.7
FLUTRIAFOL	95.0
CONSTANTE DE HENRY 25 °C (Pa m³ mol⁻¹) *:	
AZOXYSTROBIN	7.40 x 10-09
FLUTRIAFOL	1.27 X 10-06
KOW (LogP) pH 7; 20°C *:	
AZOXYSTROBIN	2.5
FLUTRIAFOL	2.3
pH:	5,9
DENSIDAD g/ml:	10.774
PRESION DE VAPOR 20°C; mPa *:	
AZOXYSTROBIN	7.40 X 10-09
FLUTRIAFOL	4.0 X 10-04

*Datos pertenecientes al ingrediente activo

USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, mascara anti-salpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración



PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTACTAR CON LA EMPRESA COLECTA.

Tel: +57(601) 704-3399 - Cel: +57 321 3583401/+57 3502392046



Sharda Colombia S.A.S.
Carrera 46 No 22B-20
Edificio Salitre Office
Torre Empresarial
Oficina 211
Tel. (601) 6223314
BOGOTÁ, COLOMBIA

FICHA TECNICA

PRODUCTO: FUNGIMIX 325 SC
CLASIFICACION: FUNGICIDA AGRICOLA

VERSIÓN: 03.2S.
FECHA ACTUALIZADA: 07/23.
REGISTRO NACIONAL: PL0012182023

artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos. Acuda al médico en caso de irritación.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavarlos con abundante agua fresca durante 10 o 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si es el caso.

EN CASO DE INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. No suministrar nada a una persona inconsciente **NO INDUCIR EL VÓMITO.**

Nota: Nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

☐ No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los equipos.

☐ No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser arrastrados, por aire o agua de escorrentía, hacia cultivos susceptibles.

☐ Establecer franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 100 metros para aplicaciones aéreas distantes de ríos, carreteras, personas, animales, cultivos susceptibles por contaminación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCION: FUNGIMIX 325 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro, perteneciente al grupo químico de las estrobilurinas y triazoles, posee acción curativa, preventiva y de erradicación.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha	P.R.	P.C.
ROSAS	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0,6 L/ha	4 horas	N.A.
ARROZ	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i> Kuhn)	0.5 L/ha	4 horas	15 Días
CAFÉ	Roya del cafeto (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.6 L/ha	4 horas	15 Días
TOMATE	Tizon (<i>Alternaria solani</i>)	0.3 L/ha	4 horas	15 Días
PAPAYA	Cercosporiasis (<i>cercospora caricae</i>)	0.6 L/ha	4 horas	4 horas

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

P.C: Periodo de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar el producto de manera preventiva ó con la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Para cultivo de Tomate se recomiendan dos aplicaciones del producto previa evaluación del control en la primera aplicación; para cultivos de Arroz, Café, Rosas



PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTACTAR CON LA EMPRESA COLECTA.

Tel: +57(601) 704-3399 - Cel: +57 321 3583401/+57 3502392046



Sharda Colombia S.A.S.
Carrera 46 No 22B-20
Edificio Salitre Office
Torre Empresarial
Oficina 211
Tel. (601) 6223314
BOGOTÁ, COLOMBIA

FICHA TECNICA

PRODUCTO: FUNGIMIX 325 SC
CLASIFICACION: FUNGICIDA AGRICOLA

VERSIÓN: 03.2S.
FECHA ACTUALIZADA: 07/23.
REGISTRO NACIONAL: PL0012182023

y Papaya se recomiendan hacer una sola aplicación del producto.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Llene el tanque con la mitad de agua necesaria junto con la dosis recomendada de **FUNGIMIX 325 SC**, posteriormente complete el tanque con el resto del agua. La mezcla debe ser agitada constantemente y no debe guardarse para el día siguiente.

COMPATIBILIDAD: No presenta fitotoxicidad en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en esta etiqueta, sin embargo se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad con variedades nuevas

FITOTOXICIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se realicen mezclas con otros plaguicidas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE
AL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA Y LA HOJA
INFORMATIVA ADJUNTA.**

**"DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE
ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y
LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO
EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE
FIN".**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



**PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONTACTAR CON LA
EMPRESA COLECTA.**
Tel: +57(601) 704-3399 - Cel: +57 321 3583401/+57 3502392046